



참부엉이 / *Asio otus*

구분	설명
생물분류	야생동물

속국명	
과국명	올빼미과
과명	Strigidae
일반특징	<p>생태적 특징 : 산 속의 가느다란 이파리가 돋아난 침엽수가 자라는 숲에서 살며, 주로 밤에 활동을 한다. 둥지로는 매나 말뚝가리가 만들었던 둥지를 이용하여 알을 낳고, 드물게 큰나무 뿌리 근처에도 알을 낳아서 새끼를 키운다. 알을 낳는 시기는 5월 중순에서 5월 말 즈음이다. 알은 흰색으로 4~6개 낳아 27~28일 동안 품는다.</p> <p>일반적 특징 : 겨울철에 돌아나는 깃은 암컷과 수컷 모두 머리꼭대기, 뒷머리가 잿빛을 띤 흰색으로 어두운 갈색의 벌레 먹은듯한 모양의 얼룩무늬가 있다. 뿔처럼 생긴 깃은 검은색으로 가장자리가 옅은 크림색이다. 뒷목, 어깨 깃, 등, 허리는 진한 노란 갈색 바탕에 어두운 갈색의 중심이 되는 반점이 있고, 각 깃털 끝에는 벌레 먹은듯한모양의 얼룩무늬가 있다. 눈 주위의 무늬가 뚜렷하며, 노란 갈색을 띤다. 눈앞의 긴 털은 노란 갈색으로 끝이 검은색이다. 턱밑과 그 아랫부분은 흰색이며, 가슴, 배 옆구리는 크림색을 띤 노란 갈색으로, 어두운 갈색의 중앙 세로 얼룩무늬가 있고, 각 깃의 끝에 벌레 먹은듯한 모양의 갈색 무늬가 있다. 아랫배, 다리의 깃털은 크림색이 도는 노란 갈색이다. 부리는 시멘트색으로 끝은 살구색을 띤 회색이다.</p>