

: 2025 11 5 3:18



콩배나무 / Pyrus calleryana var. fauriei (C.K.Schneid.) Rehder

구분	설명
생물분류	식물
속국명	배나무속
과국명	장미과
과명	Rosaceae
일반특징	요약설명: 장미과 낙엽 활엽 관목으로 중부지방을 기준으로 한 남쪽 지역의 해발 600m 이하 산기슭과 계곡에서 자란다. 일본과 중국에도 분포한다. 분포지역: ▶일본과 중국에도 분포한다. ▶중부 이남의 표고 600m이하 야산의 양지바른 산록과 계곡에 자생한다 형태: 낙엽 활엽 관목 크기: 높이 3m정도에 이른다. 꽃색: 백색 개화기: 4월,5월 잎은 어긋나고 넓은 달걀 모양 또는 둥근 모양이다. 점첨두 또는 끝이 짧고 뾰족한 모양이며 심장저와 비슷하거나 밑부분이 넓고 뾰족하다. 가장자리에 뭉뚝하고 작은 톱니가 있으며, 털이 있으나 점점 사라진다. 잎자루에도 털이 있으나 점차 없어진다. 꽃은 4~5월에 하얀색으로 피고 짧은 가지 끝에 5~9개가 모여 달린다. 꽃자루에는 잔털이 있고, 꽃잎 전체는 연한 붉은색이다. 꽃받침조각은 달걀 모양이고 톱니가 없으며 둔두이다. 양면에는 하얀 털이 촘촘히 나 있다. 꽃잎은 둥근 모양, 거꿀달걀모양 또는 넓은 달걀 모양이다. 꽃가루주머니는 자줏빛이 도는 붉은색이다. 암술대는 2~3개이고 털이 없다. 열매는 둥글고 1~월에 녹갈색에서 검은색으로 익는다. 줄기는 다각형인데 짧은 가지는 갈색으로 가시처럼 생겼다. 껍질눈은 하얗고 뚜렷하며 털이 있으나 점점 없어진다. 추위와 대기오염에 강하고 양지에서 잘 자란다. 땅의 깊이가 깊고 기름지며 습기가 적당한 곳이 적합하다. 진흙이 비교적 적게 섞인 보드라운 흙이 좋다. 씨앗을 뿌리거나 꺾꽂이를 하여 번식시킨다. 줄기가 훼손되었을 때, 새로운 줄기를 만들어내는 능력이 뛰어나다.