

_어린이 생물도감

: 2026 2 23 3:45



큰각시취 / *Saussurea japonica* (Thunb.) DC.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	취나물속
과국명	국화과

과명	Compositae
	<p>요약설명 : 국화과 두해살이풀로 전국 각지에서 자라며, 중국, 몽골, 일본, 러시아에도 분포한다.</p> <p>분포지역 : 한국, 중국, 몽골, 일본, 러시아에 분포한다. 전국에 분포한다.</p> <p>형태 : 두해살이풀.</p> <p>크기 : 높이 50~150cm 가량 된다.</p> <p>꽃색 : 자주색</p> <p>개화기 : 9월, 8월</p> <p>뿌리에서 난 잎은 꽃이 필 때까지 남아 있으며 잎자루가 길다. 잎몸은 긴 타원 모양이고 양끝이 좁으며 깃털 모양으로 얇게 갈라진다. 옆쪽 조각은 7~8쌍이다. 긴 타원 모양이고 다시 깃털 모양으로 얇게 갈라진다. 분비물을 내보내는 구조와 잔털이 있다. 줄기잎은 점점 작아지고 잎자루도 점점 짧아지다가 없어진다.</p> <p>꽃은 8~9월에 핀다. 머리모양꽃차례는 많고 위로 갈수록 길이가 짧아져 끝이 거의 평평하게 같은 높이를 갖는다. 총포는 종 모양이고 거미줄 같은 털이 있다. 총포조각은 6줄로 배열되고 원두며 조각에 곁달린 것은 얇은 종이처럼 반투명하고 메마른 재질이다. 바깥쪽 총포조각은 달걀 모양이고 작은 편이다. 꽃잎 전체에는 자줏빛이 돈다.</p> <p>열매는 수과고 끝이 평평하며 밑부분이 좁다. 약간 사각형이며 털이 없다. 자줏빛을 띠고 줄무늬와 흑자색 점이 있다. 열매 위쪽 끝부분의 털 뭉치는 두 줄로 배열되는데, 바깥쪽 같은 짧고 거칠며, 안쪽 줄의 것은 긴 깃털 모양이다.</p> <p>열매는 9~10월에 익는다.</p> <p>줄기는 곧게 서고 세로로 줄이 있다. 윗부분에서 가지가 갈라지고 털과 더불어 분비물을 내보내는 구조가 있다.</p> <p>산허리 밑에서 자란다.</p>
일반특징	