

: 2025 11 8 8:27



큰각시취 / Saussurea japonica (Thunb.) DC.

구분	설명
생물 <del>분</del> 류	식물
속국명	취나물속
과국명	국화과

과명	Compositae
일반특징	요약설명: 국화과 두해살이풀로 전국 각지에서 자라며, 중국, 몽골, 일본, 러시아에도 분포한다. 분포지역: 한국, 중국, 몽골, 일본, 러시아에 분포한다.전국에 분포한다. 형태: 두해살이풀. 크기: 높이 50~150cm 가량 된다. 꽃색: 자주색 개화기: 9월,8월 뿌리에서 난 잎은 꽃이 필 때까지 남아 있으며 잎자루가 길다. 잎몸은 긴 타원모양이고 양끝이 좁으며 깃털모양으로 얕게 갈라진다. 옆쪽 조각은 7~8쌍이다. 긴 타원모양이고 다시 깃털모양으로 얕게 갈라진다. 분비물을내보내는 구조와 잔털이 있다. 줄기잎은 점점 작아지고 잎자루도 점점짧아지다가 없어진다. 꽃은 8~9월에 핀다. 머리모양꽃차례는 많고 위로 갈수록 길이가 짧아져 끝이거의 평평하게 같은 높이를 갖는다. 총포는 종모양이고 거미줄 같은 털이 있다. 총포조각은 6줄로 배열되고 원두며 조각에 곁달린 것은 얇은 종이처럼반투명하고 메마른 재질이다. 바깥쪽 총포조각은 달걀 모양이고 작은 편이다. 꽃잎 전체에는 자줏빛이 돈다. 열매는 수과고 끝이 평평하며 밑부분이 좁다. 약간 사각형이며 털이 없다. 자줏빛을 띠고 줄무늬와 흑자색 점이 있다. 열매 위쪽 끝부분의 털 뭉치는 두줄로 배열되는데, 바깥쪽 겉은 짧고 거칠며, 안쪽 줄의 것은 긴 깃털모양이다. 열매는 9~10월에 익는다. 줄기는 곧게 서고 세로로 줄이 있다. 윗부분에서 가지가 갈라지고 털과 더불어 분비물을 내보내는 구조가 있다.