



평행줄잎말이나방 / *Acleris platynotana* (Walsingham, 1900)

구분	설명
생물분류	곤충
속국명	꼬마노랑잎말이나방속
과국명	잎말이나방과

과명	Tortricidae
일반특징	<p>머리, 가슴, 아랫입술수염, 앞날개의 바탕색은 모두 갈색이다. 날개 무늬는 진한 갈색이고, 중간 가로선과 날개 끝 부분의 안쪽 경계선은 누런색이다. 뒷날개는 회갈색이고 연한 색의 부드러운 털이 있다.</p> <p>수컷의 생식기는 옆돌기가 크고 발바닥 모양이다. 또한 파악판은 가늘고 길며, 끝 돌기가 뾰족하다. 삭쿨루스는 매우 딱딱하게 굳어 있다. 삽입기는 길고, ㄱ자 모양으로 구부러져 있으며 5~6개의 작은 사정낭침을 가지고 있다. 암컷의 생식기는 교미구판이 크고, 양쪽에 있는 돌기도 크고 넓으며 끝이 둥근 모양이다.</p> <p>국내는 강원도, 국외는 일본, 중국, 러시아에 분포한다. 일본에서는 1년에 두 번 나타나는데, 6~7월에 첫 번째 성충이, 10월 이후에 두 번째 성충이 나타난다. 애벌레는 감탕나무류, 붉가시나무, 철쭉나무류, 들쭉나무류 등의 잎을 먹는다. 성충의 모습으로 겨울을 난다.</p>