

## \_어린이 생물도감

: 2025 12 13 1:16



검정파리 / *Calliphora vomitoria* (Linnaeus, 1758)

구분	설명
생물분류	곤충
속국명	
과국명	검정파리과

과명	Calliphoridae
일반특징	<p>몸길이는 8~13mm이다. 수컷은 겹눈이 붙어 있어 이마폭이 좁으나 암컷은 한쪽 겹눈 폭과 거의 동일하다. 이마는 붉은 빛이 돌고, 옆이마는 검은 바탕에 흰가루가 덮여 있다. 더듬이는 갈색이고 2마디의 밑부분과 3마디의 윗부분은 붉은색인데, 이 때 3마디의 길이는 2마디의 3배 정도이다. 아래턱수염은 붉은 빛을 띠는 노란색이다.</p> <p>볼은 등색에 흰가루가 덮인데이다가 검은색 털이 나 있다.</p> <p>가슴등판은 검은색 광택이 난다. 앞방패판의 앞부분과 뒷방패판의 아랫부분은 흰가루로 된 세로줄이 4개 있다.</p> <p>날개맥은 어두운 갈색이며 평균은 황백색이다.</p> <p>주로 높은 산과 추운 곳에 산다. 1년 중 가장 빨리 나타나고 4월에 가장 많아진다. 더워지면 높은 산으로 이동하기 때문에 7월에는 거의 볼 수 없다.</p> <p>10~11월에 번식하며 썩은 동물과 동물의 똥에 모이는 위생해충이다.</p>