

: 2025 11 6 2:29



회색껄껄이그물버섯 / Leccinum griseum (Quel.) Sing.

| 구분                | 설명   |
|-------------------|--|
| 생물 <del>분</del> 류 | 버섯   |
| 속국명               | 껄껄이그물버섯속   |
| 과국명               | 그물버섯과  |
| 과명                | Boletaceae   |
| 일반특징              | 발생형태설명 : 혼효림의 숲속의 땅에 군생자실체형태 : 둥근산모양 또는 처음은 원추상자실체조직 : 백색 또는 약간 약간 황백색으로 공기에 접촉하면 회홍색에서 거의 흑색으로 변하지만 특히 적색을 또는 흑색으로 변색한다.자실층 : 관공은 올린관공또는 거의 떨어진 관공이며 상아색에서 갈색, 흑색으로 된다. 구멍은 소형이고 류각형이고 관공과 같은 색이며 어린자실체에서 상처를 받으면 올리브색으로 된다. 대 : 길이는 6~11cm 이고 위쪽으로가늘고 가운데는 약간 굵다. 표면은 회백색 의 바탕에 회색에서 흑색인 가는 인편이 있다.나중에 아래가 거칠다. 분포지역 : 전국 발생계절 : 여름~가을 |