

: 2025 11 7 5:20



골등골나물 / Eupatorium lindleyanum DC.

| 구분 | 설명 |
|-------------------|-------|
| 생 물분 류 | 식물 |
| 속국명 | 등골나물속 |
| 과국명 | 국화과 |

| 과명 | Compositae |
|------|--|
| 일반특징 | 요약설명: 국화과 여러해살이풀로 일본, 오키나와, 대만, 중국, 말레이지아, 인도네시아, 타일랜드, 인도, 만주, 필리핀에 분포하며 우리나라 전국 각지에 야생한다. 분포지역: ▶일본, 오키나와, 대만, 중국, 말레이지아, 인도네시아, 타일랜드, 인도, 만주, 필리핀에 분포.▶전국 각지에 야생 형태: 여러해살이풀 크기: 높이 약 70cm이다. 꽃색: 자주색,붉은색,백색 개화기: 8월,7월,10월,9월 줄기는 전체에 거친 털이 있으며 곧게 서 있다. 뿌리는 짧은 뿌리줄기로부터 수염뿌리가 뭉쳐난다. 잎은 마주나기하며 밑부분의 것은 꽃이 필 때 쓰러지고 중앙부의 것은 잎자루가 거의 없다. 중앙부의 잎은 둔두, 예저이다. 잎 양면에 털이 있고 뒷면에 점이 있으며 가장자리에 불규칙한 톱니가 있다. 꽃은 7~10월에 흰색 또는 붉은자주색으로 피는데 원줄기 끝의 편평꽃차례에 달린다. 낱꽃은 5개이고 약간 자줏빛이 돈다. |