



괭이밥 / *Oxalis corniculata* L.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	괭이밥속
과국명	괭이밥과

과명	Oxalidaceae
일반특징	<p>요약설명 : 팽이밥과 여러해살이풀로 제주, 전북, 경남, 경북, 강원, 경기, 함남에 야생한다.</p> <p>분포지역 : 제주, 전북, 경남, 경북, 강원, 경기, 함남에 야생한다.</p> <p>형태 : 여러해살이풀</p> <p>크기 : 높이 약 10~30cm</p> <p>꽃색 : 노란색</p> <p>개화기 : 8월, 7월, 6월, 5월</p> <p>밭이나 길가에 난다.</p> <p>줄기는 많은 대가 나와 옆으로 또는 위를 향해 비스듬이 자라며 전체에 잔털이 있고 가지가 많이 갈라진다. 원뿌리는 땅속 깊이 들어가고 그 위에서 많은 대가 나온다.</p> <p>잎은 어긋나기하며 긴 잎자루 끝에서 3개의 작은잎이 옆으로 퍼져 있으나 빛이 없을 때는 오므라든다. 작은잎은 거꿀심장모양이고 가장자리와 뒷면에 털이 약간 있다.</p> <p>꽃은 5~8월에 노란색으로 피는데 잎겨드랑이에서 긴 꽃자루가 곧게 나와 그 끝에 1~8개의 꽃이 날개깃모양모양꽃차례로 달린다. 꽃받침조각은 5개, 꽃잎은 5개이며 긴타원모양이다.</p> <p>열매는 9월에 열리는데 둥근 기둥 모양이고 여섯개의 각이 지며 익은 후 다수의 씨앗을 터뜨린다. 씨앗은 양쪽이 볼록하며 양쪽에 옆으로 주름살이 진다.</p>