

: 2025 11 6 6:02



구릿대 / Angelica dahurica (Fisch. ex Hoffm.) Benth. & Hook.f. ex Franch. & Sav.

구분	설명
생 <del>물분</del> 류	식물
속국명	당귀속

과국명	산형과
과명	Umbelliferae
일반특징	요약설명: 산형과 두해살이풀 또는 3년초로 일본, 만주, 중국, 동시베리아에 분포하며 우리나라 제주, 전북, 경남, 경북, 충남, 충북, 강원, 경기, 평북, 함북에 야생한다. 분포지역: 한국(제주, 전북, 경남, 경북 등), 일본, 만주, 중국, 동시베리아에 분포한다. 형태: 두해살이풀 또는 3년초이다. 크기: 높이 1-2m정도이다. 꽃색: 백색 개화기: 8월,6월,7월 산골짜기 냇가에서 자란다. 줄기는 붉은자주색에 흰가루가 덮이며 윗부분에 잔털이 있고 가지가 갈라진다. 뿌리는 굵고 겉은 갈색이며 뿌리를 백지라 한다. 뿌리에서 난 잎과 밑부분의 잎은 잎자루가 길고 3개씩 2~3회 날개깃모양으로 갈라진다. 작은잎과 깃조각잎은 긴 타원형이다. 잎 가장자리에 규칙적이고 예리한 톱니가 있으며 잎 뒷면은 흰빛이 돌며 때로 맥위와 가장자리에 잔털이 있다. 꽃은 6~8월에 흰색 꽃이 핀다. 겹우산모양꽃차례에 달리고 작은 꽃차례는 20~40개이다. 열매는 분과로 편평한 타원형이고 아랫쪽이 들어가며 뒷면에 능선이 있다. 열매는 껍질이 쪽으로 갈라진다.