

: 2025 11 5 1:32



극남노랑나비 / Eurema laeta (Boisduval, 1836)

구분	설명
생 <del>물분류</del>	곤충
속국명	남방노랑나비속
과국명	흰나비과

## https://www.korea-index.com/photo

과명	Pieridae
일반특징	앞날개는 전반적으로 짙은 노란색이다. 남방노랑나비와 매우 비슷하지만, 앞날개 끝부분 검은 테두리가 안쪽으로 파여 있는 부분이 다르다. 가을형의 경우, 암수 무늬가 같으나 수컷은 앞날개 아랫면에 등황색의 성표가 있다. 그러나 이것은 날개를 편 상태에서는 뒷날개에 가려 보이지 않는다. 여름나비의 경우 암컷이 수컷보다 노란빛이 연하고 뒷날개 윗면 가장자리에 검은색 무늬가 있으며 앞날개에 검은 띠가 없으므로 쉽게 구별할 수 있다. 풀밭, 논밭 등 경작지를 비롯하여 하천 가장자리의 넓은 땅에서 서식한다. 마을 주변이나 학교 운동장 주위를 낮게 날아다니기도 한다. 봄형은 5월 중순~6월, 여름형은 7월~11월, 겨울을 나고 그 다음해 3월~4월에 걸쳐 1년에 3~4번 나타난다. 수컷은 떼를 지어 습지나 오물에 잘 모이며, 남방노랑나비와 섞여 있을 때도 있다. 암수 모두 엉겅퀴 등의 꽃에서 꿀을 빨아 먹는다. 암컷은 먹이가 되는 식물 위를 날아다니다가 잎 표면에 낱개로 알을 낳는다. 성충일 때 겨울을 난다.