



극남노랑나비 / *Eurema laeta* (Boisduval, 1836)

구분	설명
생물분류	곤충
속국명	남방노랑나비속
과국명	흰나비과

과명	Pieridae
일반특징	<p>앞날개는 전반적으로 짙은 노란색이다. 남방노랑나비와 매우 비슷하지만, 앞날개 끝부분 검은 테두리가 안쪽으로 파여 있는 부분이 다르다. 가을형의 경우, 암수 무늬가 같으나 수컷은 앞날개 아랫면에 등황색의 성표가 있다. 그러나 이것은 날개를 편 상태에서는 뒷날개에 가려 보이지 않는다.</p> <p>여름나비의 경우 암컷이 수컷보다 노란빛이 연하고 뒷날개 윗면 가장자리에 검은색 무늬가 있으며 앞날개에 검은 띠가 없으므로 쉽게 구별할 수 있다. 풀밭, 논밭 등 경작지를 비롯하여 하천 가장자리의 넓은 땅에서 서식한다. 마을 주변이나 학교 운동장 주위를 낮게 날아다니기도 한다. 봄형은 5월 중순~6월, 여름형은 7월~11월, 겨울을 나고 그 다음해 3월~4월에 걸쳐 1년에 3~4번 나타난다. 수컷은 떼를 지어 습지나 오물에 잘 모이며, 남방노랑나비와 섞여 있을 때도 있다. 암수 모두 엉겅퀴 등의 꽃에서 꿀을 빨아 먹는다. 암컷은 먹이가 되는 식물 위를 날아다니다가 잎 표면에 알개로 알을 낳는다. 성충일 때 겨울을 난다.</p>