



금빛흰구멍버섯 / *Perenniporia subacida* (Peck) Donk

구분	설명
생물분류	버섯
속국명	흰구멍버섯속

과국명	구멍장이버섯과
과명	Polyporaceae
일반특징	<p>버섯의 자실체는 크게 갓, 주름, 대로 나누어진다. 금빛흰구멍버섯의 갓은 편평하게 넓어진 상태고, 서로 합쳐져 광범위하게 자란다. 견고하게 붙어있으며 난황색에서 담황갈색이다. 주변부는 대백색 또는 크림색이다. 그 조직은 질기고 건조하면 단단해지며 담황갈색이다.</p> <p>주름은 구멍모양이다. 구멍은 원형 또는 다각형이다. 차츰 공벽이 갈라져 구멍 입구는 다소 톱니와 같은 모양이다. 관공은 층을 형성한다. 관공벽은 두터우나 차츰 얇아진다.</p> <p>소나무 기부, 소나무 줄기 부위, 소나무 가지, 죽은 소나무 밑동, 죽은 소나무 껍질, 죽은 나무 줄기에서 발생한다.</p> <p>분포지역 : 관악산, 치악산, 월악산, 계룡산, 칠갑산, 주왕산</p> <p>발생계절 : 여름, 가을</p>