



긴꼬리홍양진이 / Uragus sibiricus

구분	설명
생물분류	야생동물

속국명	
과국명	되새과
과명	Fringillidae
일반특징	긴꼬리홍양진이는 수컷의 이마에서 등까지는 어두운 붉은색이다. 이마와 정수리 깃 끝은 옅은 갈색이고, 뒷목의 각 깃 끝은 잿빛을 띤 갈색이며, 어깨깃과 등깃의 끝은 옅은 갈색이다. 허리와 위꼬리덮깃은 장밋빛이다. 턱밑, 멍(목의 밑 부분), 귀의 깃털은 장밋빛으로 각 깃의 끝은 녹색을 띤 흰색이다. 긴꼬리홍양진이는 수컷의 이마에서 등까지는 어두운 붉은색이다. 이마와 정수리 깃 끝은 옅은 갈색이고, 뒷목의 각 깃 끝은 잿빛을 띤 갈색이며, 어깨깃과 등깃의 끝은 옅은 갈색이다. 허리와 위꼬리덮깃은 장밋빛이다. 턱밑, 멍(목의 밑 부분), 귀깃은 장밋빛으로 각 깃의 끝은 녹색을 띤 흰색이다. 기타 몸 아랫면은 잿빛을 띤 흰색이며, 배의 각 깃털 끝은 흰색이다. 긴꼬리홍양진이는 주로 냇가, 논밭 주변, 구릉, 산기슭의 키 작은 나무나 덤불이 있는 낮은 숲에 찾아와 산다. 동지는 바닷가나 논밭 주위에 있는 키 작은 나무의 가지 위에 나무 껍질, 마른 풀, 가는 뿌리 등을 이용해서 밥그릇 모양으로 만든다. 겨울에는 주로 식물이나 씨앗을 먹으며, 여름에는 곤충을 먹는다. 알을 낳는 시기는 5월 하순~7월 하순이다. 알은 녹색색 바탕에 검은 갈색의 얼룩점이 있으며, 3~4개 낳는다.