

: 2025 11 4 12:30



길뚝사초 / Carex bostrychostigma Maxim.

구분	설명
생 <del>물분</del> 류	식물
속국명	사초속
과국명	사초과

과명	Cyperaceae
일반특징	요약설명: 사초과 여러해살이풀이다. 전국에 걸쳐 분포한다. 분포지역: 전국에 걸쳐 분포한다. 형태: 여러해살이풀이다. 크기: 꽃대의 높이는 10~40cm이다. 꽃색: 갈색 개화기: 4월,5월 습기가 있는 길가, 산기슭 응달에서 흔하게 자란다. 줄기 전체에 털이 없고 부드러우며 밑으로 처진다. 뿌리줄기는 짧게 옆으로 뻗는다. 잎은 편평하고 부드러우며 연한 녹색이다. 밑부분의 잎집은 노란갈색이며 섬유질이고 잎이 달린다. 꽃대는 모여나기하며 밑부분이 흑갈색 섬유로 덮혀 있고 밋밋하며 밑으로 처진다. 꽃은 4~5월에 갈색 꽃이 피며 작은이삭이 5~10개 있다. 작은이삭은 5~10개이며 수꽃이삭은 꼭대기에 달리고 줄 모양이며 끝이 뾰족하고 검은 빛이 도는 황갈색이다. 암꽃이삭은 옆에 달리며 꽃이 약간 성글게 달린다. 암술대는 밑부분이 굵으며 끝이 3개로 갈라진다.