



까마귀머루 / *Vitis ficifolia* var. *sinuata* (Regel) H. Hara

| 구분 | 설명 |
|------|-----|
| 생물분류 | 식물 |
| 속국명 | 포도속 |
| 과국명 | 포도과 |

| | |
|------|--|
| 과명 | Vitaceae |
| 일반특징 | <p>요약설명 : 포도과 낙엽 활엽 덩굴성으로 인도, 부탄, 네팔, 중국, 일본과 우리나라 전라남도, 경상북도, 울릉도에 분포한다..</p> <p>분포지역 : 인도, 부탄, 네팔, 중국, 일본; 전라남도, 경상북도, 울릉도에 분포.</p> <p>형태 : 낙엽 활엽 덩굴성.</p> <p>크기 : 길이 2m.</p> <p>꽃색 : 녹색</p> <p>개화기 : 7월</p> <p>산과 들의 양지에서 자란다.</p> <p>덩굴손으로 다른 나무에 기어올라가거나 지상으로 뻗는다. 어린 줄기는 뾰족한 모서리가 있으며 붉은갈색의 부드러운 솜털로 덮여 있다</p> <p>잎은 어긋나기하며 둥근 모양이며 잎 끝이 3~5개로 깊게 갈라진다. 뒷면에 회갈색 혹은 흰털이 뽀뽀하게 있다. 가을에 잎이 붉게 물든다.</p> <p>꽃은 연한 연두색이며 6월 말~8월 중순에 핀다. 양성화와 단성화가 한 그루에 같이 달려 있다. 꽃잎은 끝이 합쳐지며 밑부분은 갈라져 있다.</p> <p>원뿔모양꽃차례는 잎과 마주나기하나 잎보다 짧으며, 꽃대에서 덩굴손이 발달한다.</p> <p>열매는 토마토처럼 여러개의 씨가 들어있는 장과로 보랏빛 검은색이다. 열매 안에는 2~3개 씨앗이 들어 있으며 9월 말에 익는다.</p> |