



까치밥나무 / *Ribes mandshuricum* (Maxim.) Kom.

| 구분   | 설명     |
|------|--------|
| 생물분류 | 식물     |
| 속국명  | 까치밥나무속 |
| 과국명  | 범의귀과   |

|      |  |
|------|--|
| 과명   | Saxifragaceae  |
| 일반특징 | <p>요약설명 : 범의귀과 낙엽 활엽 소관목으로 지리산과 북부지방의 고산지대에서 자라며 중국에도 분포한다.</p> <p>분포지역 : ▶중국에도 분포한다.▶지리산과 북부지방의 고산지대에서 자란다.</p> <p>형태 : 낙엽 활엽 소관목.</p> <p>크기 : 높이가 2m정도 된다.</p> <p>꽃색 : 녹색,노란색</p> <p>개화기 : 6월,5월</p> <p>높은 산 숲 속에서 자란다.</p> <p>줄기는 가지에 털이 없다. 겨울눈은 달걀모양이며 털이 있다. 일년생가지에 짧은 털과 샘점이 있다.</p> <p>잎은 등글고 3~5개로 갈라지며 예두 심장저고 겹톱니가 있다. 잎 표면은 녹색이고 잔털이 있으며 뒷면에는 융털이 있다. 잎자루는 털이 거의 없다.</p> <p>꽃은 양성화로 5~6월에 총상꽃차례를 이루며 연두색으로 핀다. 꽃차례에 털이 뽀뽀하게 있다. 많은 양성꽃이 달리며, 꽃받침통은 둥근 달걀 모양이다. 꽃받침조각은 등글고 뒤로 젖혀지고, 꽃잎은 작으며 거꿀달걀모양으로 뒤로 젖혀지고 수술은 길게 밖으로 나오며 암술대는 2개로 갈라진다.</p> <p>열매는 공모양이며 털이 없고 7~8월에 붉게 익으면 먹을 수 있다.</p> |