



꼬리겨우살이 / *Loranthus tanakae* Franch. & Sav.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	꼬리겨우살이속
과국명	꼬리겨우살이과

과명	Loranthaceae
일반특징	<p>요약설명 : 꼬리겨우살이과 낙엽활엽 반기생성 관목으로 한국의 평안남도, 충청북도, 경상북도 영주시, 경상남도, 제주도, 설악산, 지리산, 태기산에서 자란다. 일본과 중국에서도 볼 수 있다.</p> <p>분포지역 : 일본, 중국 / 한국(평안남도; 충청북도; 경상북도 영주시; 경상남도; 제주도; 설악산, 지리산, 태기산)</p> <p>형태 : 낙엽활엽 반기생성 관목이다.</p> <p>크기 : 높이 20-40cm</p> <p>꽃색 : 녹색, 노란색</p> <p>개화기 : 6월</p> <p>잎은 마주나기하고 주걱 같은 긴 타원형이다. 끝은 둔하고 밑은 뾰족하며, 가장자리는 밋밋하다.</p> <p>꽃은 6월에 녹색으로 핀다. 꽃대가 없고 가지 끝에 이삭꽃차례가 달린다. 열매는 장과이고 거꿀달걀모양이다. 9월에 연한 누런색을 띠며 익고, 아래로 처진다.</p> <p>가지는 갈라지며 서로 엇갈리는 모양이다. 진한 자줏빛을 띠는 갈색이며 털이 없고 약간 광택이 난다. 겨울이 지나면 껍질이 벗겨진다.</p> <p>주로 밤나무나 참나무류의 가지에서 자란다.</p>