

: 2025 11 5 7:37



꼬마까마귀부전나비 / Satyrium prunoides (Staudinger, 1887)

| 구분 | 설명 |
|-------------------|----------|
| 생물 분 류 | 곤충 |
| 속국명 | 까마귀부전나비속 |
| 과국명 | 부전나비과 |

https://www.korea-index.com/photo

| 과명 | Lycaenidae |
|------|---|
| 일반특징 | 참까마귀부전나비와 비슷하지만 크기가 작으며, 수컷의 앞날개 윗면 중실 끝에 무늬가 없고, 뒷날개 윗면에도 주홍색 무늬가 없다는 차이가 있다. 수컷이 암컷보다 크기가 약간 작은 것 외에는 무늬로 암수 구별이 힘들기 때문에 배끝을 조사해도 알 수 없다. 암컷은 먹이가 되는 식물 줄기의 갈라진 틈새에 한 개씩 알을 낳는다. 낮은 산지의 숲 가장자리나 계곡 주변에서 찾아볼 수 있다. 수컷은 능선에 있는 나무들 중에 가운데 비교적 작은 나무 위, 산꼭대기에서 자기 구역을 지키려는 행동을 한다. 또 큰까치수영, 개망초와 같은 흰 꽃에 즐겨 모여서 꿀을 먹는다. 알의 형태로 겨울을 난다. |