



꽃싸리 / *Campylotropis macrocarpa* (Bunge) Rehder

구분	설명
생물분류	식물
속국명	꽃싸리속
과국명	콩과

과명	Leguminosae
일반특징	<p>요약설명 : 콩과의 낙엽활엽성관목으로 우리나라의 경상남도 성주, 경상북도의 야산에서 자라며 중국과 만주에서도 볼 수 있다.</p> <p>분포지역 : 경남의 성주, 경북일원의 야산에서 자라며 중국과 만주에도 분포한다.</p> <p>형태 : 낙엽활엽성관목, 수형:원개형</p> <p>크기 : 높이 1m 내외.</p> <p>꽃색 : 자주색</p> <p>개화기 : 9월,8월</p> <p>잎은 어긋나기하며 3개의 작은 잎이다. 작은 잎은 타원형 또는 긴타원형이거나 계란을 거꾸로 세운 모양이다. 또한 둔두 또는 미묘두이다. 잎의 윗면에는 털이 없고 뒷면에는 갈색의 부드러운 털이 모여 있다. 잎자루는 털이 있다.</p> <p>꽃은 8~9월에 자주색으로 핀다. 잎겨드랑이에서 나온 총상꽃차례에 달린다. 꽃받침열편의 길이는 짧거나 서로 비슷하며, 모양은 첩두이다.</p> <p>열매는 협과고 타원형이며, 10월에 익는다. 주름과 녹색의 부드러운 털이 많으며 양 끝이 좁다.</p> <p>줄기 하나에 여러 가지가 모여 나와 사방으로 퍼진다. 어린 가지에는 비단같이 부드러운 털이 있다.</p> <p>추위에 잘 견디는 편이다. 흙은 특별히 가리지 않지만 햇볕이 잘 들고, 진흙이 적게 섞인 보드라운 땅에서 잘 자란다. 땅 밑에 뿌리혹박테리아를 갖고 있어 메마른 땅에서도 잘 적응하며 바닷가나 도시의 중심에서도 잘 자란다.</p> <p>가을에 씨앗을 얻어 건조 저장했다가 씨를 뿌리기 전에 뜨거운 물에 잠깐 삶았다가 뿌린다. 씨를 뿌린 7 해에 꽃을 피우는 것이 가능하다.</p>