



나도송이풀 / *Phtheirospermum japonicum* (Thunb.) Kanitz

구분	설명
생물분류	식물
속국명	나도송이풀속

과국명	현삼과
과명	Scrophulariaceae
일반특징	<p>요약설명 : 현삼과 반기생 일년초로 한국, 중국, 일본, 러시아에 분포한다.          분포지역 : 한국, 중국, 일본, 러시아에 분포한다.          형태 : 반기생 일년초.          크기 : 높이가 30-60cm정도에 이른다.          꽃색 : 붉은색, 자주색          개화기 : 9월, 8월</p> <p>잎은 마주나기하고 세모진 달걀모양이며 끝이 뾰족하다. 깃털 모양으로 깊고 갈라지고, 갈라진 조각에는 불규칙한 톱니가 있다. 잎자루에는 날개가 있다. 꽃은 연한 홍자색으로 8~9월에 피고, 줄기 윗부분의 잎겨드랑이에서 총상꽃차례로 달린다. 꽃받침은 종모양이고 비스듬하게 5개로 갈라진다. 꽃이 진 다음에 약간 커지며, 꽃받침열편은 초록색이고 타원 모양이며 톱니가 있다. 판통의 끝부분은 2개로 갈라지며 입술모양이 된다. 윗입술꽃잎은 뒤로 기울어져 있고 끝이 파여 있으며, 아랫입술꽃잎은 퍼져서 3개로 갈라진다. 수술은 4개가 있는데, 그 중 2개가 길다. 열매는 삭과고 9~10월에 익으며 찌그러진 좁은 달걀모양이다. 끝이 뾰족하고 분비샘이 발달한 털이 있다. 씨앗은 타원모양이다. 줄기는 곧게 서고 가지가 많이 뻗어 나오며, 전체에 분비샘이 발달한 부드러운 털이 촘촘하게 있다. 높이는 30~60cm이다. 산과 들의 햇볕이 잘 드는 풀밭에서 자란다.</p>