

## \_어린이 생물도감

: 2026 2 9 1:31



나래쪽동백 / *Pterostyrax hispida* Siebold & Zucc.

| 구분   | 설명     |
|------|--------|
| 생물분류 | 식물     |
| 속국명  | 나래쪽동백속 |
| 과국명  | 때죽나무과  |

|      |  |
|------|--|
| 과명   | Styracaceae  |
|      | <p>요약설명 : 때죽나무과 낙엽 활엽 소교목으로 중부 지방을 기준으로 남쪽 지역에서 자란다.</p> <p>분포지역 : 중부 이남에서 식재된다.</p> <p>형태 : 낙엽활엽소교목.</p> <p>크기 : 수고 10m에 달한다.</p> <p>꽃색 : 백색</p> <p>개화기 : 5월, 6월</p> <p>잎은 어긋나고 긴 타원모양, 거꾸로 세운 달걀처럼 생긴 긴 타원모양 또는 좁은 타원모양이고, 예두 또는 점첨두보다 덜 뾰족한 형태이다. 곁면은 초록색이고 퍼진 털이 다소 있으며, 뒷면은 회백색이고 맥 위에 별 모양의 털이 있다. 가장자리에는 돌기 같은 톱니가 있다.</p> <p>꽃은 5~6월에 하얀색으로 총상꽃차례에 달린다. 아래로 처지고 별 모양 털이 촘촘히 모여 있으며, 흰색 털이 나 있고 꽃자루가 거의 없다. 꽃받침은 삼각형이다. 꽃잎 전체는 하얀색이고 반 정도 벌어져 있으며, 날잎은 거꾸로 된 바늘모양이다. 수술은 10개인데 길고 짧은 것이 서로 어긋나 있으며 아랫부분이 통 모양으로 붙어서 하나가 된다.</p> <p>열매는 거꿀달걀모양이고 모가 진 선이 10개가 있어 각져 보이며 9월에 익는다. 또한 연한 노란색 털이 촘촘히 나 있고 끝 부분에는 암술대가 남아 있다.</p> <p>나무껍질은 다갈색이고 광택이 있으며, 털은 없지만 어릴 때 털이 있는 경우도 있다.</p> <p>양지와 음지 모두에서 잘 자라고 진흙이 적게 섞인 보드라운 땅을 좋아하며, 대기오염에는 강하나 염분에는 매우 약하다. 새들이 씨앗을 즐겨 먹기 때문에 번식시키려면 9월에 빨리 채취하여 건조하지 않게 보관했다가 바로 씨를 뿌리거나, 땅에 저장해 두었다가 봄에 씨앗을 뿌리면 된다. 잎이 넓고 커서 남쪽 나라의 정서나 멋을 풍기며, 꽃은 야성적인 아름다움이 있다.</p> |
| 일반특징 |  |