



: 2026 2 23 11:07



남방노랑나비 / *Eurema hecabe* (Linnaeus, 1758)

구분	설명
생물분류	곤충
속국명	남방노랑나비속
과국명	흰나비과

과명	Pieridae
일반특징	<p>날개는 진노랑색이며, 앞날개 끝부분에 검은 테두리가 넓게 발달되어 있다. 그 테두리의 안쪽 중간 부분이 굽곡지며 파여 있다.</p> <p>남부지방 및 제주도 지방의 콩과 식물이 많은 장소에 서식한다. 봄형은 5월중순에서 6월, 여름형은 7월에서 11월, 겨울을 난 후, 그 다음해 3월에서 4월에 걸쳐 1년에 3~4번 나타난다. 수컷은 습지에 잘 모이는 습성이 있는데 때로는 집단으로 모여 물을 먹기도 한다. 암수 모두 개망초, 꿀풀 등의 꽃에서 꿀을 빨아 먹는다. 암컷은 하루 중 온도가 높은 시간에 먹이 식물의 잎 표면에 낱개로 알을 낳는다. 가끔 서식지가 아닌 중부 지방까지 이동하여 채집되는 경우도 있지만 그곳에서 겨울을 나는 것은 불가능하다고 알려져 있다. 성충일 때 겨울을 난다.</p>