

 어린이 생물도감

: 2026 6 11 5:24



2012년도 식물·곤충
표본정리·DB구축사업

Herbarium of Inha University (IUD)
Incheon, KOREA
仁荷大學校 生物學科 植物標本室

Family: *Rosaceae* (장미과)

Sci.Name: *Pyrus ussuriensis* var. *nankaiensis* T.
Note: 남해배 LEE

Korea: 인천시 서구 가좌동 절마산
Mt. Cheolma-san Gajwa-dong, Seo-gu, Incheon-si)
Alt.
Date: 29. May. 2004
Coll. Soyeong Kim
Det. No.

남해배나무 / *Pyrus ussuriensis* var. *nankaiensis* (Nakai) T.B.Lee

구분	설명
생물분류	식물
속국명	배나무속
과국명	장미과
과명	Rosaceae
일반특징	<p>요약설명 : 장미과 낙엽 활엽 교목으로 전국의 인가 근처 및 산에서 자란다. 분포지역 : 전국의 인가 부근 및 산지에서 자란다. 형태 : 낙엽활엽교목 크기 : 수고 10m 정도 꽃색 : 백색 개화기 : 4월,5월 잎은 어긋나고 둥근 모양 또는 계란처럼 둥근 모양이며 점첨두 원저이다. 양면에 털이 없고 가장자리에는 바늘모양의 톱니가 있다. 잎자루에는 털이 나있다. 꽃은 4~5월에 하얀색으로 피고, 편평꽃차례에 달린다. 꽃잎은 거꿀달걀모양이다. 꽃자루에는 털이 없다. 꽃받침조각은 세모난 창 모양이고 끝이 둥글며 옆으로 퍼진다. 암술대 밑부분에는 털이 있다. 열매는 둥근 모양이고, 8-10월이 되면 노란색으로 익으며 열매자루에 털이 있다. 줄기는 하나이고 곧게 서며 나무껍질은 흑갈색으로 잘게 갈라진다. 어린가지는 자갈색이고 털이 있다. 추위에 잘 견디고 음지와 양지 모두에서 잘 자란다. 대기오염에 대한 저항성도 높은 편이지만 건조함에는 약하다. 가을에 채취한 씨앗을 땅에 저장해두었다가 다음 해 봄에 뿌리는 방식으로 번식시킨다. 헛가지와 잎자루 및 열매자루에 털이 있는 산돌배나무의 변종이다.</p>