



냉초 / *Veronicastrum sibiricum* (L.) Pennell

구분	설명
생물분류	식물
속국명	냉초속
과국명	현삼과

<p>과명</p>	<p>Scrophulariaceae</p>
<p>일반특징</p>	<p>                     요약설명 : 현삼과 여러해살이풀로 일본, 홋카이도, 만주, 중국, 시베리아에 분포한다.                      분포지역 : 일본, 홋카이도, 만주, 중국, 시베리아에 분포한다.강원(설악산), 평북, 함남, 함북에 야생한다.                      형태 : 여러해살이풀                      크기 : 높이가 50-90cm로 털이 난다.                      꽃색 : 붉은색, 자주색                      개화기 : 8월, 7월                      잎은 3~8개씩 여러 층으로 둥글게 둘러나기하며 1m 가까이 높게 자라는 특이한 식물이다. 잎자루가 없고 긴 타원모양 또는 타원모양이다. 끝이 뾰족하고 가장자리에 톱니가 있다.                      꽃은 7-8월이 되면 원줄기 끝에 총상꽃차례로 달리며, 이 꽃차례의 밑에서부터 피어 올라간다. 꽃받침은 5개로 깊게 갈라지며 꽃받침 조각의 끝은 뾰족한 창 모양이다. 꽃잎 전체는 통모양이고 끝이 얇게 4개로 갈라지며 붉은빛이 도는 자주색이다. 통처럼 되어 있는 부분의 안쪽에는 털이 뽀뽀하게 모여 있다. 수술은 2개이고 길게 밖으로 나온다. 수술대는 자주색이며 밑부분에 털이 있다. 씨방은 2칸으로 되어 있고 암술대와 수술대는 길이가 거의 같으며 밖으로 길게 나온다. 둘 다 하얀색이고 털이 없다.                      삭과는 끝이 뾰족한 넓은 달걀모양이며 밑부분에 꽃받침이 달려 있다.                      줄기는 모여나기하고 털이 있으며 그 높이는 50~90cm이다. 뿌리는 나무처럼 단단한 짧은 뿌리줄기에서 잔뿌리가 여러 군데로 퍼져 나간다. 산지의 약간 습기가 있는 곳에서 자란다. 9~10월에 채취한 씨앗을 곧바로 뿌리고, 다음 해 봄에 싹튼 것을 8~9월에 옮겨 심는 방법으로 번식시킨다.                 </p>